

TETANUS

SPOEDEISENDE HULP

FRANCISCUS GASTHUIS

Welke risicogroepen zijn er?

Iedereen die niet voldoende gevaccineerd is, kan tetanus krijgen. Sommige mensen lopen echter een extra groot risico. Dit zijn:

- Personen met diepe, uitgebreide en/of verontreinigde wonden, in het bijzonder tweede- en derdegraads brandwonden.
- Intraveneus (via een ader) drugsgebruikers.
- Pasgeboren baby's van niet gevaccineerde moeders die onder slechte omstandigheden ter wereld komen.
- Personen met een beroep waarbij een verhoogde kans op verwondingen én contact met tetanussporen mogelijk is, zoals werk met groente-, fruit- en tuinafval (GFT), veegdiensten, grondarbeiders, hoveniers, veetelers, land- en tuinbouwers, veldsporters, dierenartsen en mensen die met paarden werken.
- Hiv-geïnfecteerden met een slechte immuunrespons en andere immuungecompromitteerde patiënten.

Bijwerkingen

Er kunnen overgevoelighedsreacties optreden, zoals roodheid en zwelling, koorts en zich onwel voelen. Ook kunnen plaatselijke reacties op de injectieplaats optreden.

Welke injecties heeft u nodig?

- U heeft alleen een eenmalige herhalingsinjectie nodig.

- U krijgt in totaal vier injecties in een tijdsbestek van een half jaar.

De eerste twee injecties krijgt u op de Spoedeisende Hulp van Franciscus Gasthuis. De injectie met de antistoffen, de tetanus-immunoglobuline, en de injectie met het vaccin, de tetanustoxoïd. De antistoffen geven u een directe bescherming en met het vaccin wordt uw lichaam gestimuleerd om zelf de antistoffen tegen tetanus te maken.

De laatste twee injecties worden door uw huisarts gegeven. U krijgt hiervoor een recept mee, waarop de twee ampullen tetanus-toxoïd zijn voorgeschreven. De ampullen dient u in de koelkast te bewaren.

De eerste injectie dient u te krijgen na één maand en de tweede en laatste injectie na zes maanden. Het is belangrijk dat u het voorgeschreven vaccinatieschema helemaal afmaakt, om optimale bescherming tegen tetanus te verkrijgen.

Hoe lang is mijn vaccinatie geldig?

De vaccinatie beschermt u voor een periode van tien jaar. Voor hiv-geïnfekteerden met een slechte immunrespons en andere immuungecompromitteerde patiënten, geldt een andere procedure.

Heeft u nog vragen?

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met uw huisarts.