

**BIOLOGICAL GEBRUIK TIJDENS DE
ZWANGERSCHAP**

Inleiding

U ontvangt deze folder omdat u tijdens de zwangerschap een biological heeft gebruikt. Dit middel heeft mogelijk invloed op het afweersysteem van uw kind. In deze folder bespreken we waar u op moet letten.

Invloed van biologicals

Biologicals kunnen via de placenta bij de baby terechtkomen, waardoor de effecten of bijwerkingen ook bij de pasgeboren kinderen voorkomen. Een van de belangrijkste bijwerkingen van biologicals is onderdrukking van het afweersysteem. Dit kan in sommige gevallen leiden tot een groter risico op infecties. Ook kan het effect hebben op de afweer, opgebouwd na vaccinaties. Daarom bespreken we hieronder enkele adviezen waar u als ouder of voogd rekening mee moet houden.

Adviezen

Laagdrempelig contact met uw huisarts

Als uw kind koorts heeft, neem dan laagdrempelig contact op met uw huisarts. Dit geldt gedurende het eerste levensjaar of totdat uw kinderarts aangeeft dat dit niet meer nodig is. Wij stellen uw huisarts op de hoogte dat uw kind laagdrempelig beoordeeld moet worden.

Extra vaccinatie

Uw kind zal via het Centrum Jeugd en Gezin meestal een extra vaccinatie krijgen op de leeftijd van 6-9 weken. Dit is omdat het kinkhoestvaccin, wat de moeder meestal tijdens de zwangerschap krijgt, mogelijk minder effectief is door de biological.

Geen levend verzwakte vaccins

Uw kind mag gedurende het eerste levensjaar geen vaccinaties krijgen met levend verzwakte vaccins. Dit gaat om de volgende vaccins:

- BMR;
- BCG;
- Oraal poliovaccin;
- Rotavirus;
- Varicella;
- Gele koorts.

Deze vaccins komen in het eerste levensjaar niet voor in het Rijksvaccinatieprogramma. Uw kind kan het officiële vaccinatieschema dus gewoon doorlopen! Mocht u toch één van bovenstaande vaccinaties willen geven, bijvoorbeeld in verband met een reis, neem dan contact op met uw kinderarts.

Let op! Het rotavirusvaccin kan besmettelijk zijn. Voor dit vaccin geldt dat ook huisgenoten van uw kind dit vaccin niet mogen krijgen.

Afspraken

Uw kind zal eenmaal een controle rond de leeftijd van 6 weken bij een kinderarts krijgen. Hier worden eventuele bloeduitslagen besproken en de noodzaak voor verder vervolg of ontslag uit controle.

Vragen?

Het kan zijn dat u na het lezen van deze folder nog vragen heeft. U kunt deze stellen aan de kinderarts die uw kind nakijkt na de bevalling of tijdens het 6-weken consult. Mocht u tussendoor vragen hebben, kunt u ons bellen: Maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur via 010 – 461 6225

U vindt de polikliniek Kindergeneeskunde bij balie 380 op de 3e verdieping in het Franciscus Gasthuis of balie 2.17 op de 2e verdieping in Franciscus Vlietland.